

インフルエンザワクチン接種(成人)について

接種期間 10月5日(月)～ 令和 年1月29日(金)

※ワクチンがなくなり次第終了

***2階 A・Bブロック受付前、窓側カウンターにて
9時～11時まで受付。受付時間終了後は、各ブロックでの
受付をお願いいたします。**

◇対象者 16歳以上

◇料金 5,100円 (自費請求となります)
※65歳以上等の方は自治体からの補助がある場合があります。
お住まいの自治体をご確認ください。

《その他、ワクチン接種のご予約は

3階ワクチンセンター、又は下記お電話にて承ります》

*接種場所 ワクチンセンター(中央エレベーターにて3階)

*接種日時 毎週月曜日～木曜日(1月～は水曜日まで)
14:30～16:00(最終受付15:30まで)

TEL:平日 **024-526-0300** (代表) *ワクチン予約まで
(予約受付時間 9:00～16:00)

※ ワクチンセンターでは、インフルエンザ・コロナ同時接種できます。

新型コロナワクチン接種について

ワクチンの種類	
◆明治ファルマ◆ コスタイベ(mRNAワクチン) 対象:18歳以上 ※コロナワクチンで発熱など 副反応がなかった方に限ります	◆武田薬品◆ ヌバキソビット(不活化ワクチン) 対象:中学生以上

◇料金 15,300円 (自費請求となります)
※65歳以上等の方は自治体からの補助がある場合があります。
お住まいの自治体をご確認ください。



大原綜合病院
OIHARA GENERAL HOSPITAL

インフルエンザワクチン接種(小児)について

小児科かかりつけの小児(15歳以下)について

接種期間 10 月 5 日(月)～ **12 月 28 日(月)**

※ただし、ワクチンがなくなり次第終了

接種時間 診療時間内

受付場所 **小児科外来窓口〈完全予約制〉**

受付時間 **8:30～9:00 または 15:00～17:00**

対 象 者 **定期的な外来予約患者さんのみ**
※インフルエンザワクチン接種のみの受診はお受けできません。

料 金 自費請求となります

注射	① 13歳以上15歳以下	: 5,100円
	② 3歳以上13歳未満	: 3,300円
	③ 6か月以上3歳未満	: 2,700円

②③は2～4週間空けての2回接種となります。

経鼻	④ フルミスト点鼻 (2歳以上15歳以下)	: 8,300円
----	--------------------------	----------

※自治体からの補助がある場合があります。

お住まいの自治体をご確認ください。



大原綜合病院
OHARA GENERAL HOSPITAL

「新型コロナワクチン接種（26-27 シーズン）」の説明書

新型コロナワクチンは令和 6 年度より「定期接種 B 類」となり、その接種対象者は接種当日 65 歳以上の高齢者、及び 60-64 歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があり身体障害者手帳 1 級の方々です。その接種の目的は重症化予防効果です。一方、それ以外の方でも、基礎疾患等があり重症化が心配される方は、「任意接種」として積極的に接種する意味合いはあります。過去のデータによると、コストイベやヌバキソビットの重症化予防効果は徐々に低下するものの 1 年間持続します。

コストイベの特徴は、高い発症予防効果が証明されていること、一方ヌバキソビットの特徴は、mRNA ワクチンで発熱した方でも安全に接種できることです。

1. ワクチン株

NB.1.8.1 株（コストイベ）、XFG 株（ヌバキソビット）

2. 予防接種不適当者（接種出来ない人）

- (1) 発熱している方（体温 37.5℃以上） (2) 重篤な急性疾患に罹患されている方 (3) 本ワクチンの接種液成分でアナフィラキシー（じんましん、呼吸困難、血管浮腫 など）があらわれたことがある方 (4) その他、接種不適当な方

3. 予防接種要注意者（注意した上で接種を判断する人）

- (1) 過去に新型コロナワクチンで発熱した方（コストイベの場合） (2) 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
(3) 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方
(4) 過去にけいれん（ひきつけ）の既往のある方 (5) 接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方

4. ワクチン接種後の一般的な注意点

- (1) 接種後 24 時間は副反応の出現に注意し、特に接種後 30 分以内は接種医療機関内で健康状態の変化に注意する
(2) 接種当日の入浴は差し支えないが、注射部位をこすらない (3) 過激な運動や大量の飲酒は、それ自体で体調変化をきたすので、接種後 24 時間は避ける
(4) 接種後、高熱やけいれんなど体調変化が現れた時は、速やかに接種医療機関に相談・受診する (5) 接種後、他の予防接種には接種間隔制限はない

5. ワクチンの種類と接種後の副反応 ➡ 今年度、当財団で使用するワクチンは 2 種類で、「mRNA ワクチン」と「組換えタンパクワクチン（不活化）」です。

種類	mRNA ワクチン	mRNA ワクチン	組換えタンパクワクチン
製造メーカー	ファイザー社	Meiji Seika ファルマ社	武田薬品工業社
ワクチン名	コミナティ	コストイベ	ヌバキソビット
重大な副反応	ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎		ショック、アナフィラキシー
50%以上	痛み、疲労、頭痛	痛み	痛み、疲労、筋肉痛、頭痛痛み、倦怠感
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ	倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ、しこり、赤み	倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐
1～10%	赤み、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛	かゆみ、下痢、吐き気・嘔吐	腫れ、しこり、赤み、発熱、四肢痛

上記に示される「痛み、腫れ、しこり、赤み」などは、接種部位の症状であり、その一部は接種後 7 日以後に現れます。

厚労省/新型コロナワクチン定期接種リーフレット（令和 6 年 1 月版）より一部引用

6. 予防接種健康被害救済制度

予防接種後に健康被害（副反応）と診断され、且つ、予防接種と因果関係があると認定された場合、定期接種では「予防接種法」、また、任意接種では「医薬品医療機器総合機構法」による健康被害救済制度があるので、その疑いがある場合には「接種医療機関」などに申し出て下さい。

なお、高齢者新型コロナワクチンは定期接種（B 類疾病）に該当するので、「接種医療機関」或いは「居住地の行政機関（感染症予防係）」に申し出てください。

2026 年 10 月改訂（新型コロナワクチン/26-27 シーズン）： 大原記念財団